



АЛЬБЕНДАЗОЛ-Л 10%

листок-вкладыш

Описание

Порошок белого цвета.

Состав

100 г препарата содержат действующее вещество:
альбендазол - 10 г.

Вспомогательные вещества: сахарная пудра, крахмал, кальция карбонат.

Фармакологические свойства

АТСvet QP52A, антигельминтные ветеринарные препараты (QP52AC11, альбендазол)

Альбендазол - ангельминтик из группы бензимидазолов с широким спектром действия. Альбендазол влияет на энергетический метаболизм гельминтов. Тормозит синтез фумаратредуктазы, приводит к уменьшению гликогена, вызывает гибель паразитов от истощения.

Альбендазол-Л 10% - препарат широкого спектра действия, который предназначен для лечения животных при паразитарных заболеваниях, вызванных желудочно-кишечными и легочными нематодами (круглыми червями), цестодами (ленточными червями) и трематодами.

Биодоступность в Альбендазола-Л 10% низкая. Время достижения максимальной концентрации альбендазол сульфоксида составляет 2-5 ч. Связывается с белками плазмы крови на 70%.

Выводится с желчью через кишечник в виде активного метаболита альбендазол сульфоксида, только небольшое его количество выводится с мочой.

Применение

Профилактика и лечение крупного рогатого скота, овец, коз, собак, кошек, кур при инвазионных заболеваниях, вызываемых:

У крупного рогатого скота, овец и коз:

желудочно-кишечными нематодами: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia spp*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*;

легочными нематодами: *Duclayocaulus viviparus*;

цестодами: *Moniezia expansa*;

трематодами: *Fasciola hepatica* (взрослые особи).

У лошадей:

желудочно-кишечными нематодами: *Parascaris equorum*, *Strongylata spp*.

У свиней:

желудочно-кишечными нематодами: *Hyostrogylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Oesophagostomum dentatum*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*.

У собак, кошек и пушных зверей:

желудочно-кишечными нематодами: *Toxocara spp.*, *Toxascaris spp.*, *Uncinaria spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Trichocephalus spp.*;

цестодами: *Taenia solium*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum*;

трематодами: *Opistorchis felinus*.

У кур:

нематодами: *Ascaridia galli*.

Дозировка

Внутри в смеси с кормом, однократно в дозе г\10 кг живой массы:

Вид животных	Доза
Крупный рогатый скот	0,75 (при трематодозах-1,5)
Овцы, козы	0,5 (при трематодозах-1,0)
Лошади	0,75
Свиньи	0,95
Собаки, кошки и пушные звери	2,5
Куры	1,0

Противопоказания

Повышенная чувствительность к альбендазолу.

Предостережение

Для крупного рогатого скота, овец и коз применение препарата во время беременности и лактации возможно без ограничений, однако применять препарат необходимо осторожно, не превышая терапевтических доз, особенно в первый месяц беременности.

Сукам и свиноматкам нельзя применять препарат во время беременности и сукам - во время лактации.

Убой животных на мясо разрешается через 14 суток после последнего применения препарата, молоко в пищу людям используют через 4 суток. До указанного срока молоко и мясо скармливают непродуктивным животным или утилизируют.

Форма выпуска

Банки полиэтиленовые с крышками, пакеты полиэтиленовые или ламинированные по 500 г.

Хранение

В упаковке при температуре от 2 до 30°C и относительной влажности не более 75% .

Срок годности - 3 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua

Производитель готового продукта:

ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпочтач»

Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16

Тел. 0800211201

www.ukrzoovet.com.ua