

Комбітрем® емульсія
(емульсія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Емульсія білого або ледь кремового кольору без запаху та смаку.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

триклабендазол – 50,0;

альбендазол – 100,0.

Допоміжні речовини: тилоза, твін-80, вода дистильована.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати

Активність препарату ґрунтується на взаємодії двох антигельмінтиків: альбендазолу та триклабендазолу. Завдяки сумарній дії діючих речовин, Комбітрем® емульсія ефективний проти статевозрілих і личинкових стадій фасціол. Його найбільш доцільно застосовувати на ранній стадії інвазії. Препарат ефективний щодо фасціол і дикроцелій (*Fasciola hepatica*, *F. gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum*), згубно діє на всі види шлунково-кишкових і легеневих нематод (родин *Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Marshallagia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Chabertia* тощо), статевозрілих цестод (родів *Moniezia*, *Trisanosoma*) та личинкових стадій цестод (родини *Echinococcus* і *Alveococcus*).

Альбендазол належить до групи бензімідазолів, які гальмують білковий (тубулярний) синтез, у результаті чого порушується надходження і внутріклітинне транспортування поживних речовин та обмін субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції, шляхом гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.

Триклабендазол вступає у взаємодію з рецепторами тубулозолу, що призводить до порушення дії тубуліну (напр, у спермогенезі фасціол), однак не має тератогенної дії для тварин. Таким чином, триклабендазол пригнічує синтез протеїну в фасціолах та може руйнувати окислювальне фосфорилування, що призводить до загибелі усіх форм розвитку фасціол протягом кількох годин після застосування препарату.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець і кіз при захворюваннях на фасціольоз та асоціативні гельмінтози.

Дозування

Перед застосуванням препарат добре збовтати !

Препарат призначають тваринам у дозах:

велика рогата худоба - 1 мл препарату на 10 кг маси тіла, одноразово з водою;

вівці та кози - 0,75 мл препарату на 10 кг маси тіла, одноразово.

При випасанні худоби профілактично-лікувальну дегельмінтизацію проводять на початку стійлового періоду.

Протипоказання

Не встановлені.

Застереження

Після останнього застосування препарату забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб, молоко можна вживати в їжу через 2 доби.

Не застосовувати препарат Комбітрем® емульсія самкам у першій третині вагітності ! Не застосовувати препарат вівцематкам під час парувального періоду і впродовж одного місяця після видалення баранів з отари !

Форма випуску

Полімерні або скляні флакони по 50, 100, 300, 1000 мл; пластикові каністри по 5, 10 л.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 4 до 25 °С.

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИЙ № 1

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині !

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400