

**Бровадазол плюс®**  
**(порошок для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Білий порошок без запаху, нелеткий, негігроскопічний, нерозчинний у воді.

**Склад**

1 г препарату містить діючі речовини (мг):

піперазину адипінат – 250,0;

фенбендазол – 30,0.

Допоміжна речовина: мальтодекстрин.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet QP52A, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AC13, фенбендазол)**

Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканальців травних клітин та появою нейротоксичного ефекту в гельмінтів. Фенбендазол згубно діє на личинки різних стадій, а також порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при потраплянні в навколишнє середовище не спроможні в подальшому розвиватись. Комбінація фенбендазолу та піперазину адипінату внаслідок синергізму посилює дію препарату проти збудників родини *Ascaridae*.

**Застосування**

Дегельмінтизація коней, свиней, м'ясоїдних (собак, лисиць, песців), кролів, птиці (кури, індики, папуги, перепілки, фазани), водоплавної птиці (гуси, качки) при нематодозах:

**у свиней:** при нематодозах травного каналу (статевозрілі та личинки 4-ї стадії) *Ascaris suum*; *Oesophagostomum edentatum*, *Strongyloides ransomi* (статевозрілі); *Trichuris suis*; легеневих гельмінтозах — *Metastrongylus spp.*;

**у коней:** при нематодозах травного каналу *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Strongylidae gen.*;

**у м'ясоїдних (собак, лисиць, песців):** при нематодозах травного каналу *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leoninae*, *Uncinaria stenocephala*;

**у кролів:** при *Passalurus ambiguus*;

**у птиці (кури, індики, папуги, перепілки, фазани):** *Ascaridia galli*, *Capillaria anseris*, *Heterakis gallinarum*, *H. isolochae*, *Tetrameres spp.*,

**у водоплавних птахів (гуси, качки):** *Amidostomum anseris*, *Syngamus trachea*, *Tetrameres fassisipina*.

**Дозування**

**Свині:**

• аскароз, трихоцефальоз, езофагостомоз, метастронгільоз, стронгілоїдоз, хіостронгільоз - 1,5 г на 10 кг маси тіла дві доби поспіль;

• оллюляноз, фізоцефальоз - 3,0 г на 10 кг маси тіла дворазово, через добу.

**Поросята від 1-4 місяців:**

• з профілактичною метою - 0,4-0,5 г на 10 кг маси тіла одноразово щотижня.

**Коні:**

• параскароз, оксіуроз, стронгілятоз, стронгілоїдоз - 1,5-2,0 г на 10 кг маси тіла одноразово.

**Лошата від 1-6 місяців:**

• змішана інвазія - 1,0 г на 10 кг маси тіла два дні поспіль.

**М'ясоїдні і хутрові звірі:**

• анкілостомоз, стронгілоїдоз, токсакароз, токсаскароз, унцинаріоз - 8,0-10,0 г на 10 кг маси тіла три доби поспіль.

**Кролі:**

• пасалуроз, протостронгільоз, трихостронгільоз, трихоцефальоз - 5,0 г на 10 кг маси тіла одноразово.

**Кури:**

• аскаридіоз, гетеракідоз, капіляріоз - 1,5 г на 10 кг маси тіла два дні поспіль;

- сингамоз - 2,0 г на 10 кг маси тіла два дні поспіль.

**Водоплавна птиця:**

- амідостомоз, тетрамероз, гангулетеракідоз - 2,0-2,5 г на 10 кг маси тіла;
- гіменолепідоз, нотокотілідози - 7,5-8,0 г на 10 кг маси тіла дві доби поспіль.

**Протипоказання**

Не призначати свиноматкам за два тижні до опоросу !

**Застереження**

Забій тварин і птиці на м'ясо дозволяють через 7 діб після останньої дегельмінтизації. Препарат несумісний з лугами та окиснювачами, а також з йодовмісними препаратами !

**Форма випуску**

Пластикові контейнери або пакети із полімерних матеріалів по 10, 20, 50, 100, 1000 г.

**Зберігання**

Сухе темне місце при температурі до 25°C.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині !*

**Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400

**Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18 а,

м. Бровари Київської обл., 07400