

**Броватріол**  
листівка-вкладка

**Опис**

Таблетки зеленого кольору округлої (масою 1 г) та плоскої овально-продовгастої (масою 3 г) форми із витисненою роздільною рисою з однієї сторони та патентованим логотипом підприємства з другої сторони.

**Склад**

1 г препарату ( $1 \pm 0,05$  г) містить діючі речовини (мг,  $\pm 5\%$ ):

триклабендазол – 55;

альбендазол – 110;

празіквантел – 40.

Допоміжні речовини: крохмаль, лактозу, глюкозу, тальк, кальцію стеарат, крейду і харчовий барвник.

**Фармакологічні властивості**

*АТСvet QP52A, антигельмінтні засоби (QP52AA, похідні хінолону і споріднені до них речовин; QP52AA51, празіквантел; QP52AC11, альбендазол)*

Фармакологічні властивості препарату ґрунтуються на комбінованій взаємодоповнюючій синергичній дії трьох діючих речовин: триклабендазолу, альбендазолу і празіквантелу, які забезпечують високу антигельмінтну активність щодо більшості гельмінтів (цестоди, трематоди та нематоди).

Броватріол високоефективний до:

- цестод (*Moniezia*, *Avitellina* та *Thysaniezia* (статевозрілі і личинкові стадії);
- трематод (*Fastiola hepatica*, *F. gigantica*, *Dicrocoelium lanceatum* на всіх стадіях їх розвитку)
- нематод (*Dictyocaulus*, *Haemonchus*, *Ostertagia*, *Marshallagia*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Cooperia*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Chabertia* тощо).

**Застосування**

Індивідуальна дегельмінтизація великої рогатої худоби, верблюдів, буйволів, яків, овець, кіз при ураженні нематодами, цестодами та трематодами.

**Дозування**

Доза препарату для різних видів жуйних тварин:

*Велика рогата худоба, верблюди, буйволи, яки* – одна таблетка масою 3 г на 40 кг маси тіла тварини.

Профілактичну дегельмінтизацію худоби проводять два рази в рік (на початку стійлового періоду та перед пасовищним). За показами лікувальну дегельмінтизацію проводять у будь-який період року за призначенням спеціаліста ветеринарної медицини.

*Вівці, кози* – 1 таблетка масою 1 г на 15-17 кг маси тіла або 1/2 таблетки масою 3 г на 23-25 кг маси тіла; одна таблетка масою 3 г на 35-40 кг маси тіла.

Визначену відповідно до маси тіла таблетку задають тварині примусово на корінь язика. Допускається дегельмінтизація груповим методом. При цьому, визначену для групи тварин кількість таблеток подрібнюють та змішують з половиною добової норми комбікорму. Таку лікувально-кормову суміш згодують під час ранішньої годівлі.

**Протипоказання**

Не застосовувати клінічно хворим та виснаженим тваринам.

**Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб після останнього застосування препарату, молоко можна використовувати у їжу через 2 доби.

Не застосовувати препарат самкам у перший місяць після осіменіння.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

**Форма випуску**

Таблетки фасують у контурне чарункове упакування (блістер) з полімерного матеріалу з фольговою основою по 10 шт. (таблетки масою 1 г) і по 5 шт. (таблетки масою 3 г) або в пластикові контейнери по 100, 150, 200 чи 500 шт.

**Зберігання**

Захищене від світла місце при температурі до 30 °С .

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18 а, м. Бровари, Київської  
обл., 07400, Україна

**Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18 а, м. Бровари,  
Київської обл., 07400, Україна