

Бровадазол™ 20 %
(порошок для перорального застосування, мікрогранульований)
листівка–вкладка

Опис

Мікрогранульований порошок білого кольору, без запаху.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину (мг):

фенбендазол - 200,0.

Допоміжні речовини: лактоза, глюкоза, кальцію карбонат, крохмаль картопляний.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (ATCvet QP52AC13, фенбендазол)

Механізм дії фенбендазолу пов'язаний з порушенням енергетичного обміну, руйнуванням мікроканалців травних клітин та проявом нейротоксичного ефекту у гельмінтів. Фенбендазол також згубно діє на личинки різних стадій, порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів. Останні при потраплянні у навколишнє середовище не спроможні до подальшого розвитку.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, м'ясоїдних, хутрових звірів, курей, гусей при ураженні нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод та їх яйцями.

Дегельмінтизація риби родини корошових при ботріоцефальозі.

Дозування

<i>Вид тварин, назва гельмінтозів</i>	<i>Разова доза (на 10 кг маси тіла)</i>	
	<i>Бровадазол™ 20%, г</i>	<i>Кратність застосування, інтервал</i>
<i>Велика рогата худоба</i>		
диктіокаульоз, неоаскароз, стронгілятози, стронгілоїдоз,	0,4	одноразово
трихуроз	0,75	2, щодоби
дикроцеліоз	1,0	5, щодоби
цистицеркоз	1,25	3, щодоби
парамфістоматидози	0,75	5, щодоби
<i>Вівці, кози</i>		
неоаскароз, протостронгілоїдоз, стронгілоїдоз, трихостронгілоїдоз	0,25	одноразово
трихуроз	0,5	2, щодоби
диктіокаульоз	0,5	одноразово
монієзіоз, тизанієзіоз	0,5	одноразово
ларвальні цестодози: ехінококоз, ценуроз	2,0	3, щодоби
дикроцеліоз	1,0	3, щодоби
<i>Свині</i>		
аскароз, метастронгілоїдоз, трихуроз	0,5	2, через 12 год.
езофагостомоз, олуланоз, стронгілоїдоз	0,2	2, через 12 год.
змішана інвазія (профілактично): поросята з 2-х до 10-тижн. віку	0,05	1 раз щотижня
молодняк на відгодівлі	0,2	1 раз щомісяця
ехінококоз	1,0	5, щодоби
<i>Коні</i>		

ПРИМІРНИК № 1

параскароз	0,75	одноразово
кишкові стронгілятози	0,5	одноразово
стронгілоїдоз (лошата)	0,4	2, щодоби
Собаки, коти		
анкілостомоз, капіляріоз, теніїози, трихуроз, токсаскароз, токсакароз	2,0	3, через 12 год
Хутрові звірі (песці, лисиці)		
змішана нематодозна інвазія	0,75	2, щодоби
Кролі		
змішана нематодозна інвазія	0,5	3, щодоби
Кури, індики		
аскаридїоз, гетеракоз, капіляріоз	0,5	4-5, щодоби
Гуси, качки		
амідостомоз, ехінуріоз, капіляріоз, сінгамоз, стрептокароз, тетрамероз	0,5	4-5, щодоби
Риби родини корокових		
ботріоцефальоз	1,25	2, щодоби*

Гранулят у суміші з кормом згодують під час вранішньої годівлі.

*Для проведення дегельмінтизації риби готують лікувально-кормову суміш (ЛКС):

0,25 кг препарату старанно перемішують з 99,75 кг комбікорму та гранулюють. Лікувальна (добова) доза ЛКС для кожної водойми становить 5 % від розрахункової маси риби. Добову дозу ділять на 3-4 рівномірних порцій, які з двогодинним інтервалом вносять у визначені місця годівлі протягом дня. ЛКС вносять у водойму дві доби поспіль. Інший корм не рекомендується вносити в ці дні.

Якщо в господарстві не використовували комбікорм для годівлі риби, то перед проведенням дегельмінтизації необхідно привчити рибу до комбікорму і до місць годівлі.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам одночасно з протифасціольозними препаратами, а також протягом 7 діб після лікування тварин бромсалами.

Застереження

Після останнього введення препарату забій тварин на м'ясо дозволяють:

- велика рогата худоба, вівці, кози, свині – через 10 діб;
- птиця – через 3 доби.

Використання субпродуктів (печінка, легені, серце) у їжу дозволяють через 20 діб.

Молоко від лактуючих самок можна вживати в їжу через 2 доби після останнього застосування препарату.

Вилон риби для споживання людям дозволяють через 10 діб після дегельмінтизації.

Форма випуску

Контейнери з полімерних матеріалів по 10, 20, 25, 100 г; пакети з полімерних матеріалів по 100, 250, 500 або 1000 г.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному місці за температури від мінус 30 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)

б-р Незалежності 18-а,

м. Бровари Київської обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

Виробник готового продукту
ТОВ "БРОВАФАРМА" (Україна)
б-р Незалежності 18-а,
м. Бровари Київської обл., 07400