

Аміпін
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозора рідина жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

амітраз – 125 мг.

Допоміжні речовини: нонілфенол, ортоксилол.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QP53A – Ветеринарні ектопаразитоциди для місцевого застосування, включаючи інсектициди. QP53AD01 – Амітраз.

Амітраз – це органічна сполука синтетичного походження з групи амідинів, є акарицидом системної та контактної дії, який блокує октопамінові рецептори членистоногих, що призводить до порушень провідності нервових імпульсів, втрати рухових рефлексів, паралічу і загибелі паразита.

Володіє широким спектром акарицидної дії щодо більшості видів кліщів, які паразитують на тваринах, та виду *Varroa destructor*, який використовує в якості хазяїв медоносних бджіл.

За рекомендованих доз, термінів та технології застосування, залишки препарату майже не накопичуються в меді, перзі та воску і не перевершують прийняті максимально допустимі рівні.

Застосування

Лікування бджіл уражених кліщами *Varroa destructor*.

Дозування

Препарат застосовують після закінчення головного медозбору у період мінімальної наявності бджолиного розплоду.

Аміпін використовують у формі свіжо виготовленої водної емульсії, приготовленої шляхом рівномірного змішування 1 мл препарату з 2 літрами питної води. Обробку бджіл проводять шляхом дрібнодисперсного розпилення по 10 мл отриманої емульсії за допомогою шприца в кожний міжстільниковий простір вулика, дворазово, з інтервалом 7 днів.

У випадку виявлення кліщів *Varroa* під час ревізії, перед постановкою сімей на зимівлю, проводять разову обробку окремих неблагополучних сімей.

Допускається вибіркова обробка вражених кліщами *Varroa* бджолосімей, виявлених в результаті головної весняної ревізії пасіки після першого обльоту бджіл.

Протипоказання

Не застосовувати під час головного медозбору.

Застереження

Всі обробки бджолосімей проводять при температурі повітря не нижче 0°C.

Для обробки використовувати лише свіжоприготовлені емульсії.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, які прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Ампули із темного нейтрального скла по 0,5, 1,0 та 2,0 мл.

Зберігання:

Суше, темне, недоступне для дітей місце, при температурі від 0 до 25°C.

Термін придатності:

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту
ТОВ "БРОВАФАРМА"
бульвар Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1