

27.12.2018

Коротка характеристика продукту

1. Назва

Кобацин

2. Склад

1 мл містить діючі речовини (у хелатній формі сукцинату):

кобальт – 0,4 мг;

цинк – 0,8 мг;

германій – 0,08 мг.

Допоміжні речовини: бурштинова кислота, вода високоочищена.

3. Фармацевтична форма

Розчин для перорального застосування.

4. Фармакологічні властивості

Комбінована мінеральна кормова добавка, есенціальні елементи якої: кобальт, цинк та германій знаходяться в формі сукцинатів, котрим характерний високий рівень біологічної доступності.

Кобальт, як додаткова мікроелементна добавка, стимулює зростання яйценосності бджоломатки – до 19% понад норму звичайного розплоду, забезпечує збільшення кількості бджіл (до 30%) та активізує їх життєві функції.

Цинк бере участь в обміні нуклеїнових кислот і синтезі білків. Будучи пов'язаним з дією ферментів, гормонів та частково вітамінів, він значно впливає на основні життєві процеси: розмноження, росту і розвитку організму бджіл та їх вуглеводного і енергетичного обміну.

Германій, як сильний антиоксидант, сприяє виведенню з організму токсинів і нівелює негативний вплив факторів зовнішнього середовища. Він володіє широким спектром біологічної дії, запобігає старінню і загибелі клітин організму. Цей елемент відіграє важливу роль у формуванні резистентності в організмі і здатний профілакувати великий спектр захворювань.

Сумарне поєднання дієвості цих трьох важливих мікроелементів, являється сильним активатором розвитку бджолиних сімей, стимулює репродуктивну функцію маток, підвищує резистентність бджіл до інфекційних захворювань, подовжує період буття робочих бджіл та їх працездатності. Таким чином, прискорюється оптимальний розвиток бджолиних сімей, а їх продуктивність вірогідно збільшується.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Бджоли.

5.2 Показання до застосування

Кобацин використовують:

- навесні, для слабких і середніх за силою бджолиних сімей з метою оптимізації і прискорення їхнього розвитку до періоду повноцінного взятку;

- в першій половині літа, для сильно розвинених бджолиних сімей, з метою створення відводків;

- в продовж другої половини літа, для підтримки яйценосності бджоломатки і сили бджолиних сімей.

5.3 Протипоказання

Не виявлені.

5.4 Особливі застереження при використанні

Необхідно дотримуватись рекомендованого дозування.

5.5 Використання під час вагітності, лактації

Не стосується.

5.6 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Немає.

5.7 Способи введення і кількість для тварин різного віку

Можливий осад! Перед застосуванням препарат енергійно струшують!

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

27.12.2018

Кобацин в кількості 5,0 мл розчину додають до 1,0 л теплою (30 -35 °С) цукрового сиропу (вода-цукор у співвідношенні 1:1) та добре змішують. Таку суміш сиропу, в кількості 500 мл на бджолосім'ю, згодують 3-5 разів з інтервалом в 3-5 днів.

5.8 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Необхідно дотримуватись рекомендованого дозування. При одночасному використанні з профілактичною або лікувальною метою також і інших харчових добавок, або солей інших мікроелементів, потрібно контролювати їх склад з метою уникнення гіпервітамінозів.

5.9 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Немає.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Термін придатності

24 місяці.

6.2 Особливі заходи зберігання

В затемненому приміщенні при температурі від 5 °С до 25 °С.

6.3 Природа і склад контейнера первинного пакування

Полімерні чи скляні не прозорі флакони по 10, 50 і 100 мл; двогорлові (з дозатором) пластикові контейнери по 500 і 1000 мл.

6.4 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний продукт або його залишки мають бути утилізовані згідно чинних вимог.

Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

8. Назва і місцезнаходження виробника

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

9. Додаткова інформація

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1