



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 29.07.2015 № 4002-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 05.08.2015 р. № 2022 зареєстровано:

препарат

НЕОСТОМОЗАН

форма

Розчин для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібуρν, Франція

зареєстровано в Україні за №

АА-01327-01-10

від

05.08.2015

Виробник:

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикал Ко Лтд.

1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

04.08.2020

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату

Заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Заступник Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
Deputy Chief of State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine
Deputy Chief State Inspector of Veterinary Medicine of Ukraine



О. М. Вержиковський

Коротка характеристика препарату

1. Назва

НЕОСТОМОЗАН

2. Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Допоміжні речовини: піпероніл-бутоксид, оцтовий ангідрид, геронол FF/4/емульсон AG/L, геронол FF/емульсон AG/MS, парафінова олія, розчинник - сольвессо 150ND/ сольварекс 10 LN.

3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти (QP53AX, комбінації інших ектопаразитоцидів для місцевого застосування)

НЕОСТОМОЗАН - препарат для боротьби з ектопаразитами тварин, містить піретроїди в органічному розчиннику, які забезпечують пролонговану дію. Активно діючі речовини препарату (трансмікс та тетраметрин), діють як нейротоксини на центральну і периферичну нервову систему паразитів.

Тривалість захисту тварин від ектопаразитів при застосуванні препарату НЕОСТОМОЗАН залежить від способу обробки та умов утримання тварин.

НЕОСТОМОЗАН ефективний проти ектопаразитів: мух (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae* spp.), бліх (*Ctenocephalides* spp.), вошей (*Haemetonipinus*, *Damalinia*), коростяних кліщів (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), волосяних фолікулярних кліщів (*Demodicidae*), та іксодових кліщів (*Ixodidae*).

НЕОСТОМОЗАН володіє властивостями:

- діє проти артропод, але безпечний для теплокровних тварин (ЛД50 у щурів >7000 мг/кг);
- має широкий ектопаразитарний спектр;
- зручний у застосуванні;
- швидко метаболізується та виводиться з організму тварин.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коні (спортивні), собаки, коти.

5.2 Показання до застосування

1. Профілактика та лікування коней (спортивних), собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодекозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфестації кліщами, вошами, блохами та мухами.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

5.4 Побічна дія

Не встановлена.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат безпечний при застосуванні вагітним тваринам.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Коні (спортивні): поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодекозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вухних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спреєм-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м. Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Робочий розчин повинен бути використаний протягом 24 годин.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При значному передозуванні у тварин можливе виникнення таких симптомів: слинотеча, блювота, діарея, пригнічення. У випадку виникнення конвульсій рекомендують застосувати препарат діазепам.

5.10 Спеціальні застереження

Не застосовують препарат НЕОСТОМОЗАН продуктивним тваринам.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами. Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15- 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

- Скляні ампули по 5 x 5 мл у картонних коробках.
- Скляні ампули 100 x 5 мл у картонних коробках.
- Флакони з темного скла по 200 мл.
- Пластикові пляшки (каністри) по 1 та 5 л.
- СОЕХ флакони по 200, 250 мл, 1, 5 л.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний та протермінований препарат утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре,
33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere,
33500 Libourne

8. Назва і місце знаходження виробника

СЕВА-ФІЛАКСІА Ветеринарі Ко
Байолоджикал Ко Лтд. (Угорщина)
1107 Будапешт, Сзаллас 5

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.
Ltd (Hungary)
1107 Budapest, Szallas u. 5

9. Додаткова інформація

НЕОСТОМОЗАН
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

трансмікс - 5,0 г;

тетраметрин - 0,5 г.

Допоміжні речовини: піпероніл-бутоксид, оцтовий ангідрид, геронол FF/4/емульсон AG/L, геронол FF/емульсон AG/MS, парафінова олія, розчинник - солвессо 150ND/ сольварекс 10 LN.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX, комбінації інших ектопаразитоцидів для місцевого застосування)

НЕОСТОМОЗАН - препарат для боротьби з ектопаразитами тварин, містить піретроїди в органічному розчиннику, які забезпечують пролонговану дію. Активно діючі речовини препарату (трансмікс та тетраметрин), діють як нейротоксини на центральну і периферичну нервову систему паразитів.

Тривалість захисту тварин від ектопаразитів при застосуванні препарату НЕОСТОМОЗАН залежить від способу обробки та умов утримання тварин.

НЕОСТОМОЗАН ефективний проти ектопаразитів: мух (*Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Haematobia irritans*, *Musca autumnalis*, *Tabanidae spp.*), бліх (*Ctenocephalides spp.*), вошей (*Haemetonius*, *Damalinia*), коростяних кліщів (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), волосяних фолікулярних кліщів (*Demodicidae*), та іксодових кліщів (*Ixodidae*).

НЕОСТОМОЗАН володіє властивостями:

- діє проти артропод, але безпечний для теплокровних тварин (ЛД₅₀ у щурів >7000 мг/кг);
- має широкий ектопаразитарний спектр;
- зручний у застосуванні;
- швидко метаболізується та виводиться з організму тварин.

Застосування

1. Профілактика та лікування коней (спортивних), собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодекозу, саркоптозу і отодектозу.

2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфестації кліщами, вошами, блохами та мухами.

Дозування

1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування.

Коні (спортивні): поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби.

Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодекозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вушних раковин з інтервалом у 7 діб.

2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведенні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м². Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.

Робочий розчин повинен бути використаний протягом 24 годин.

Протипоказання

Не застосовувати продуктивним тваринам!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.

Форма випуску

- Скляні ампули по 5 x 5 мл у картонних коробках.
- Скляні ампули 100 x 5 мл у картонних коробках.
- Флакони з темного скла по 200 мл.
- Пластикові пляшки (каністри) по 1 та 5 л.
- СОЕХ флакони по 200, 250 мл, 1, 5 л.

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15- 25 °С.

Термін придатності

36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль (Франція)
10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн

Ceva Sante Animale (France)
10 avenue de la ballastiere, 33500 Libourne

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі
Байолоджикал Ко Лтд. (Угорщина)
1107 Будапешт, Сзаллас 5

CEVA-PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.
Ltd (Hungary)
1107 Budapest, Szallas u. 5

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:
трансмікс 5,0 г;
тетраметрин 0,5 г.

Застосування

перед застосуванням уважно прочитайте
листівку-вкладку!

Виробник готового продукту

СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд.
(Угорщина)

1107 Будапешт, Сзаллас 5

РП№:

Серія №:

Придатний до:

5 мл



67075/60

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування



67075/60

* - 100x5 мл, 5x5 мл

Опис	Протипоказання
Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.	Не застосовувати продуктивним тваринам! Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам! Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!
Склад 100 мл препарату містить діючі речовини: тетрамікс - 5,0 г, тетраметрин - 0,5 г.	Застереження Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.
Застосування 1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодеккозу, саркоптозу і отодектозу. 2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфекції кліщами, вошами, блохами та мухами.	Зберігання Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15-25 °С. Термін придатності 36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.
Дозування 1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування. Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби. Собаки та коті: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодеккозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень засобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вушних раковин з інтервалом у 7 діб.	Власник реєстраційного посвідчення Ceva Санте Анімаль (Франція) 10 авеню де ла багастере, 33500 Лібурн
2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведєнні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м ² . Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.	Виробник готового продукту СЕВА-ФІЛАКСІЯ Ветеринарі Байопроджикалс Ко Лтд. (Угорщина) 1107 Будапешт, Сээллас 5
	РП№:
	Серія №:
	Придатний до:
	Для застосування у ветеринарній медицині!

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування



67075/60

*
Л

Опис	Протипоказання
Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом. Склад 100 мл препарату містить діючі речовини: трансмікс - 5,0 г; тетраметрин - 0,5 г. Застосування 1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодеккоз, саркоптоз і отодектоз. 2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфекції кліщами, вошами, блохами та мухами. Дозування 1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розпилювання. Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби. Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб; за необхідності обробку повторюють. При демодеккозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зниження кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вухних раковин з інтервалом у 7 діб. 2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спрей-методом при розведєнні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м ² . Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.	Не застосовувати продуктивним тваринам! Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам! Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату! Застереження Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води. Зберігання Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15-25 °С. Термін придатності 36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.
Власник реєстраційного посвідчення Сева Санте Анімаль (Франція) 10 авеню де ла балластєре, 33500 Лібурн	Виробник готового продукту СЕВА-ФЛАКІА ВЕТЕРИНАРІ Байолджикалс Ко Лтд. (Угорщина) 1107 Будапешт, Сзаллас 5
PTNe:	
Серія №:	
Придатний до:	

Для застосування у ветеринарній медицині!

НЕОСТОМОЗАН

Розчин для зовнішнього застосування

*
МЛ



67075160

* - 100, 200, 250

Опис Розчин жовтуватого кольору зі специфічним запахом.	Протипоказання Не застосовувати продуктивним тваринам! Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам! Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату!
Склад 100 мл препарату містить діючі речовини: трансксікс - 5,0 г; тетраметрин - 0,5 г.	
Застосування 1. Профілактика та лікування спортивних коней, собак, котів при ураженнях ектопаразитами, такими як кліщі, мухи, воші, блохи; лікування демодеккозу, саркоптозу і отодектозу. 2. Обробка тваринницьких приміщень, де утримують велику рогату худобу, овець, свиней, кролів при інфекції кліщами, вошами, блохами та мухами.	Застереження Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийняти при роботі з ветеринарними препаратами. Уникати попадання препарату на слизові оболонки, в очі та на відкриті ділянки шкіри. При випадковому попаданні препарату НЕОСТОМОЗАН на шкіру або слизові оболонки його необхідно зняти тампоном і змити великою кількістю води.
Дозування 1. Препарат застосовують зовнішньо, шляхом зрошування або розприскування. Спортивні коні: поверхню тіла тварин змочують водним розчином препарату (1:400), на одну тварину застосовують приблизно 0,5-1,5 л розчину. Повторна обробка через 3 доби. Собаки та коти: застосовують водний розчин препарату (1:200) для обприскування, змочування або купання тварин. При інвазії блохами або вошами обробляють усю поверхню тіла і місця перебування тварин; паразити гинуть через декілька годин, одноразова обробка захищає від реінвазії протягом 2-3 діб, за необхідності обробку повторюють. При демодеккозі і саркоптозі обробляють уражені ділянки шкіри через кожні 10 діб до зникнення кліщів (за результатами досліджень зіскобів шкіри). При отодектозі обробляють зовнішні слухові проходи обох вухних раковин з інтервалом у 7 діб. 2. Обробку тваринницьких приміщень проводять за відсутності тварин спреї-методом при розведєнні препарату 1:400 (1 л препарату/400 л води) із розрахунку 150-180 мл водного розчину препарату/м ² . Однократна обробка забезпечує зменшення чисельності популяції мух впродовж 2-3 тижнів.	Зберігання Зберігати в захищеному від світла місці за температури 15-25 °С. Термін придатності 36 місяців. Водний розчин препарату слід використати протягом 24 годин.
	Власник реєстраційного посвідчення Сева Санте Анімаль (Франція) 10 авеню де ла балластєре, 33500 Лібурн
	Виробник готового продукту СЕВА-ФЛАКСІЯ Ветеринарі Байоподжікалс Ко Лтд. (Угорщина) 1107 Будапешт, Сээллас 5
	РП№:
Серія №:	
Придатний до:	
Для застосування у ветеринарній медицині!	